


Quelle évolution de la qualité des cours d'eau pour les diatomées depuis 20 ans en Loire-Bretagne ?

Quelle est l'évolution de la qualité des cours d'eau pour les diatomées ?


Si la mesure des diatomées existe ponctuellement depuis assez longtemps, la mise en place d'un réseau couvrant l'ensemble du bassin Loire-Bretagne date de 2006. Il est possible de tracer une chronique assez longue sur 97 stations réparties sur l'ensemble du bassin¹.

Sur cette période assez courte, et pour l'ensemble de ces stations, il n'est pas possible de constater une tendance particulière.



¹ Cette répartition n'est pas statistique mais permet d'avoir quelques résultats à l'échelle du bassin

Quels sont les résultats sur l'ensemble du bassin entre 1999 et 2013 ?



Le faible nombre de stations ne permet pas de faire des comparaisons entre secteurs sur le bassin.

De plus dans de nombreux secteurs comme le centre de la Vendée ou l'amont du bassin Vienne et Creuse il n'y a pas de stations sélectionnées.

On peut noter néanmoins deux grands secteurs plutôt dégradés, parmi d'autres, pour ces stations sélectionnées, en Pays de la Loire et dans une partie des axes Loire et Allier.

Les stations en très bonne qualité diatomées se situent sans surprise dans des zones de tête de bassin.

En raison des ajustements dans les règles d'état des eaux (ancien IBD avant 2007 et nouvel IBD2007 à partir de 2007 qui a évolué pour être compatible avec la directive cadre sur l'eau), il n'est pas possible de déduire des évolutions entre ces deux cartes.

Référence(s) / Définition(s) / Lien(s) :	Mise à jour : 15/02/2015
Banque de données http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes/osur_web	Réalisation : AELB/DEP/EVAL
Page internet : http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/graphes_d_evolution	Sources : banque de données de bassin OSUR. Producteurs : Agence de l'eau, Dreal, Départements.
Définition des diatomées : source Irstea	